

STORM® ULTRA SECURE

APPAT POUR LA REGULATION
DES RATS ET SOURIS



7 bonnes raisons d'utiliser **STORM ULTRA SECURE**

1. Nouveau support **breveté** : Plus appétent qu'une pâte et aussi résistant qu'un bloc.
2. Le **FLOCOUMAFEN** est la substance active la plus puissante du marché, aucune résistance connue à ce jour.
3. Efficace même sur les rongeurs **résistants** aux AVK**.
4. Applicable directement dans les terriers, efficace en une **seule** ingestion.
5. Sans classement utilisateur
6. **STORM® ULTRA SECURE** contrôle 100 % de la population des rongeurs en environ **14 jours** (jusqu'à 10 jours de moins par rapport aux autres appâts AVK). Permet un traitement rapide et efficace intégrant la nouvelle réglementation.
7. Les doses homologuées par l'ANSES par poste d'appâtage sont divisés par rapport à la Diféthialone, permet un traitement limitant les coûts.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Élevage

En élevage, permet de lutter contre les rats noirs, rats gris et souris.

Caractéristiques	Mode d'emploi												
<p>Composition : FLOCOUMAFEN : 25mg/kg (CAS : 90035-08-8) Nom homologué : STORM® ULTRA SECURE Type de produit : Appât rodenticide (TP14) A.M.M. : FR-2019-0001 détenue par BASF France SAS (92593 Levallois Perret France) Distribué par NEODIS (78519 Rambouillet - France) Seau de 5kg (200x25g)</p> <p>Durée de conservation : 2 ans. Conserver le produit fermé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri du soleil.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité</p>	<p><u>Catégorie d'utilisateur</u> : Professionnels <u>Méthode d'application</u> : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans les postes d'appâtage sécurisés, dans des points d'appât couverts et protégés ou directement dans les terriers.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Espèces</th><th>Lieux</th><th>Doses</th><th>Contrôles</th></tr></thead><tbody><tr><td>Souris domestique (Mus musculus)</td><td>Intérieur et extérieur autour des bâtiments</td><td>Jusqu'à 25g (1 galet) par point d'appâtage</td><td>Inspecter les postes d'appâtage tous les 2 à 3 jours (contres les souris) ou tous les 5 à 7 jours (contre les rats) en début de traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite pour vérifier s'ils sont intacts, si les appâts sont consommés, et retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.</td></tr><tr><td>Rat brun (Rattus norvegicus) Rat noir (Rattus rattus)</td><td>Intérieur et extérieur autour des bâtiments et dans les terriers</td><td>Jusqu'à 75g (3 galets) par point d'appâtage</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.</p>	Espèces	Lieux	Doses	Contrôles	Souris domestique (Mus musculus)	Intérieur et extérieur autour des bâtiments	Jusqu'à 25g (1 galet) par point d'appâtage	Inspecter les postes d'appâtage tous les 2 à 3 jours (contres les souris) ou tous les 5 à 7 jours (contre les rats) en début de traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite pour vérifier s'ils sont intacts, si les appâts sont consommés, et retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.	Rat brun (Rattus norvegicus) Rat noir (Rattus rattus)	Intérieur et extérieur autour des bâtiments et dans les terriers	Jusqu'à 75g (3 galets) par point d'appâtage	
Espèces	Lieux	Doses	Contrôles										
Souris domestique (Mus musculus)	Intérieur et extérieur autour des bâtiments	Jusqu'à 25g (1 galet) par point d'appâtage	Inspecter les postes d'appâtage tous les 2 à 3 jours (contres les souris) ou tous les 5 à 7 jours (contre les rats) en début de traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite pour vérifier s'ils sont intacts, si les appâts sont consommés, et retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.										
Rat brun (Rattus norvegicus) Rat noir (Rattus rattus)	Intérieur et extérieur autour des bâtiments et dans les terriers	Jusqu'à 75g (3 galets) par point d'appâtage											

FR20122021/2

7 en +
BOX RONGEURS : Poste d'appâtage

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor®

Précautions d'Emploi :

Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population de rongeurs et rend l'acceptation de l'appât difficile. Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer les postes d'appâtage dans d'autres endroits. En extérieur, protéger l'appât des conditions atmosphériques et placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Ne pas laver les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage. Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observés (ex ; parcours, sites de nidation, parcs d'engraissement, terriers...).

Lors de l'application dans les terriers, couvrir ou bloquer, les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

INFORMATION SECURITE :

Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques ou d'élevage et autres animaux non cibles. Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques lors de la manipulation de produit (Gants en nitrile certifiés EN374-3). Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toutes zones de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

